

INDICETRABAJOS

	Pag.
Efecto de la época de implantación de fertilizante nitrogenado sobre el contenido proteico del grano - de trigo en la región semiárida pampeana.	1
M.L.Faraldo, H.Paccapelo y S.J. Sarandon	
Determinación de los efectos relativos directos e indirectos de los componentes sobre el rendimiento de trigo.	17
H.A.Paccapelo y H.O. Lorda	
Comunidades vegetales en una catena topográfica de area medanosa-Dpto.Conhelo-La Pampa-Argentina. . . .	31
E.Cano, H.D. Estelrich y B. Fernandez.	
Fitomasa aerea de los pastizales samofilos de La - Pampa en distintos estados de condición.	43
E.Cano, H.D. Estelrich y B. Fernandez	
Determinación de proteína bruta de algunas especies forrajeras de La Pampa - Argentina.	57
C.C.Chirino; K.Norlander Grahn y L. Robles	
Fitomasa aerea acumulada en pastizales de gramíneas bajas del centro y sudeste de La Pampa - Argentina. .	75
E.Cano; H.D. Estelrich y B. Fernandez	
Tres pastizales ubicados en una catena topográfica en el sudeste de La Pampa - Argentina.	85
E. Cano; H.D. Estelrich, B. Fernandez y E.A. Morici	
Disponibilidad forrajera en un arbustal de Larrea divaricata-CAV. en el sudeste de La Pampa-Argentina. .	97
E.Cano; H.D. Estelrich y B. Fernandez	
Las Onagraceas de la Provincia de La Pampa.	105
H.M. Cunqueiro	

Cuantificación del contenido de Nitratos, Fluoruros, Sulfatos, Cloruros, Carbonatos, Hidrogenocarbonatos, Sodio, Potasio, Sales totales y Dureza Total en aguas de Santa Rosa (L.P.)	139
Gonzalez, J.D.; S.H. La Corte y N.B.Reinaudi	

Comunicaciones

Descripción botánica del híbrido interespecífico entre Zea mays L.x. Zea diploperennis I.	153
H.Troiani, H. Paccapelo y A. Golberg	

Strobelia Baccharidis Rondani (Diptera, Tephritidae) sobre Baccharis ulicina Hook, et. Arn. En la Provincia de San Luis.	159
T.Pagnone y A. Martinez	

Distribución espacial de Collaspidia sp (Coleoptera, Chrysomelidae) en el cultivo de papa.	161
A. Corral; M. Gomez y T. Pagnone	